

XXXIII

Descriptions de quelques espèces recueillies au
Japon par A. Mellotée.

FAM. **Attidae.**

1. *MEVIA MELLOTTI*, sp. nov., ♂. — Long. 5 mill. — Cephalothoracis pars cephalica nigra, pars thoracica obscure fulvo-rufescens albido-squamulata? Area oculorum angusta, postice cephalothorace multo angustior, pars thoracica postice sat valde dilatata. Pili oculorum albidi, pili clypei albo-argentei squamiformes. Clypeus dimidium oculorum mediorum saltem æquans. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, crasse albido-squamulatum, vitta media fusca, in parte apicali late interrupta, ornatum, subtus nigricans, albo-argenteo squamulatum. Mamillæ nigricantes. Sternum fulvum albido-pilosum et squamulatum. Chelæ parum longæ, fuscæ, ad apicem dilutiores, coriaceæ. Pedes longi, antici obscure fusci subnigri, metatarso tarsoque pallide testaceis, metatarso annulo apicali nigro, reliqui pedes fulvi, femoribus patellis tibiisque latissime fusco-variatis et subvittatis, patella 1 inferne haud dentata, tibiis 1 et 2 inferne 2-2 longe aculeatis atque aculeis lateralibus et intus et extus munitis, metatarsis posticis ad basin, prope medium atque ad apicem aculeatis. Pedes-maxillares breves, pallide fulvi albo-pilosi, femore ad basin anguste infuscato; patella longiore quam latiore parallela; tibia vix brevior paulo angustiore, tereti, extus apophysi apicali minuta, gracili, simplici et acuta instructa; tarso longo et angusto subcylindrico; bulbo simplici. — Yokohama.

Espèce certainement différente de *M. cylindrata* Karsh.

Genus **LAUFEIA**, nov. gen.

Cephalothorax humilis, sat elongatus, subparallelus, supra fere planus. Oculi antici fere conferti, in linea recurva. Area oculorum postice quam

antice multo angustior et postice cephalothorace multo angustior. Oculi seriei secundæ fere in medio, inter oculos laterales anticos et posticos siti. Oculi seriei tertiæ lateralibus anticis paulo minores. Chelæ robustæ, parum longæ, margine inferiore dentibus binis fere æquis carina junctis armato. Sternum coxis latius, parallelum, antice haud vel vix attenuatum. Pars labialis saltem æque longa ac lata. Pedes robusti et breves, I, IV, II, III, antici reliquis crassiores. Tibiæ metatarsique antici inferne biserialim aculeati, sed aculeis lateralibus carentes. Pedes postici, aculeis lateralibus paucissimis tibiæ et aculeis apicalibus ordinariis metatarsorum exceptis, mutici. Pubes simplex.

A gen. *Hasario* (et vicinis) et *Simætha* præsertim differt area oculorum dorsalium postice quam antice multo angustiore.

2. LAUFELA ÆNEA, sp. nov., ♂. — Long. 3,8 mill. — Cephalothorax nigro-æneus, nitidus, subtiliter coriaceus, albido et flavo-æneo parce et longe pilosus. Pili oculorum et clypei longi, sordide albidi. Abdomen breviter ovatum, nigro-æneum, nitidum, subtilissime coriaceum, fere glabrum, antice linea angusta albo-pilosa cinctum. Sternum fusco-olivaceum, nitidum. Chelæ robustæ, nigro-æneæ, coriaceæ. Pedes robusti, parum longi, femoribus nigris postice ad basin fulvis, patellis tibiisque metatarsisque anticis obscure fuscis, supra paulo dilutioribus, posticis fulvis ad apicem late fusco-annulatis, tarsis pallide flavis, anticis infuscatis. Pedes-maxillares breves et robusti, fusco-rufescentes; femore crassissimo valde compresso inferne prope medium tumidulo; patella subquadrata; tibia patella multo brevior, anguste transversa, extus apophysi validissima, infra arcuata, armata; tarso sat late-ovato; bulbo ovato ad basin producto sed parum attenuato et obtuse truncato. — Yokohama.

Genus SILER, nov. gen.

Trite (1) affinis, sed differt cephalothorace altiore, clypeo latiore quam $\frac{1}{3}$ oculorum mediorum, sterno ovato antice parum attenuato, pedibus posticis longioribus, metatarso cum tarso haud brevior quam

(1) Le genre *Trite* E. Sim., Soc. ent. Belg., C. R. sept. 1885, proposé pour deux espèces de la Nouvelle-Calédonie, est principalement caractérisé par une série de dents nombreuses à la marge inférieure des chélicères, caractère qui se retrouve chez les *Cyrra*, les *Bavia*, etc., qui, sous tous les autres rapports, diffèrent beaucoup des *Trite* et des *Siler*.

patella cum tibia, tibiis metarsisque anticis minus robustis et aculeis debilioribus armatis. Caetera ut in *Trita*.

3. *SILER CUPREUS*, sp. nov., ♀. — Long. 4 mill. — Cephalothorax niger, parte thoracica paulo dilutiore, parte cephalica fulvo thoracica sordide albido simpliciter pubescentibus, linea marginali exili viridimetallica cinctus. Pili oculorum supra flavo-aurantii, infra oculos albidi. Clypeus fere glaber. Abdomen late ovatum, nigrum, flavo-micanti squamulatum, macula media magna nigro-aenea notatum?, subtus squamulis late purpureo-micantibus obtectum. Sternum fuscum, albido parce pilosum. Pedes obscure olivacei, femoribus supra tibiis metatarsisque utrinque nigro-lineatis, femoribus, praesertim anticis, supra purpureo-squamulatis, tibiis metatarsisque lineis albo-pilosis ornatis, aculeis debilibus. Area vulvae nigra, semi-circulari, carina lata, antice valde attenuata, acuta et longe triquetra, longitudinaliter secta. — Yokohama.

FAM. *Lycosidae*.

Genus *TRICCA*, nov. gen.

Trochosa C. Koch, 1848 (ad partem *intricata*). *Lycosa* E. Sim., Ar. Fr., III (ad partem *lutetiana*).

Oculi antichi aequi (*lutetiana*) vel medii paulo majores (*intricata*), appropinquati, in linea *sat valde recurva*, multo latiore quam linea secunda. Oculi ser. secundae mediocres et parum disjuncti, spatio dimidio diametro oculi haud latiore vel angustiore sejuncti. Clypeus oculis anticis haud latior vel angustior. Chelarum margo inferior dentibus 3 (*intricata*) vel 4 (*lutetiana*, *japonica*) armatus. Pedes breves et robusti, tarsi metatarsique antichi scopulis raris et longis muniti, tarsi postici inferne setulosi. Patellae quatuor anticae muticae, tibiae quatuor anticae muticae vel fere muticae. Metatarsi aculeis brevissimis et dentiformibus paucis armati. Mamillae brevissimae, subaequales.

A *Lycosa* differt imprimis linea oculorum anticorum recurva et pedibus anticis fere muticis, ab *Ocyale* Sav. (non auct.) differt clypeo angusto et pedibus multo minus aculeatis.

4. *TRICCA JAPONICA*, sp. nov., ♂ (pullus). — Long. 6,8 mill. — Cephalothorax pallide fusco-rufescens, parte cephalica et thoracica antice

in medio parum dense et longo flavido-pilosis, parte thoracica utrinque glabra paulo obscuriore et lineis radiantibus fuscis vix expressis notata. Oculi antici æqui, parum sed evidenter disjuncti, in linea minus recurva quam in *T. lutetiana*. Clypeus oculos anticos circiter æquans. Pedes breves et robusti, obscure fulvo-olivacei, versus extremitates sensim infuscati. Tibiæ quatuor anticae aculeo interiore minutissimo et setiformi tantum armate. Metatarsi aculeis brevissimis 2-2-4 subtus instructi. — Yokohama.

FAM. Theridionidæ.

5. *ARIAMNES CYLINDROGASTER*, sp. nov., ♂. — Cephaloth., long. 2,3 mill. Abd., long. 12,5 mill. — Cephalothorax subtiliter coriaceus, prope medium transversim valde impressus, pallide fusco-rufescens, antice et prope marginem sensim dilutior sed linea marginali exillima obscura cinctus. Area oculorum mediorum fere æque longa ac lata, antice quam postice paulo latior, oculi medii antici reliquis paulo majores. Abdomen longissimum, cylindratum, vermiforme et sinuosum, breviter et parce pilosum, obscure rufo-violaceum, subtus paulo dilutius et in parte prima late testaceo-marginatum. Sternum fulvo-rufescens, subtilissime coriaceum. Pedes longissimi, femoribus patellis tibiisque pallide rufo-violaceis, reliquis articulis luridis. Pedes-maxillares fulvi; femore sat longo paululum arcuato, versus apicem levissime incrassato; patella saltem duplo longiore quam latiore, teretiusecula; tibia patella saltem $\frac{1}{3}$ brevior paululum incrassata, ad apicem recte secta; tarso magno, longe ovato, apice truncato et emarginato cum angulo superiore paululum producto et obtusissimo; bulbo sat complicato.

♀. — Cephalothorax pallide luridus, subtilissime coriaceus, antice striis cephalicis obliquis abbreviatis et prope medium stria transversa procurva impressus. Abdomen late flavum, leviter micanti-tinctum. — Sternum pedesque omnino pallide lurida. — Yokohama.

6. *EURYOPIS MUSTELINA*, sp. nov., ♀. — Long. 2,5 mill. — Cephalothorax pallide luridus, parte cephalica leviter infuscata, oculis nigrolimbatis. Oculi postici magni, in linea vix recurva, medii late ovati, spatio diametro oculi paulo angustiore sejuncti, spatio inter medios et laterales paulo latiore. Oculi antici approximati, in linea procurva. Area mediorum haud longior quam latior et antice quam postice latior. Cly-

peus leviter infuscatus, area oculorum latior, leviter depressus. Abdomen oblongum, postice acuminatum, nigrum, parce et sat longe pilosum, vitta media albo-testacea, validissime crenulato-dentata, et in parte secunda vittis latis obliquis testaceis utrinque ornatum, saepe vittis obscurioribus interdum haud conspicuis. Venter testaceus vel infuscatus. Sternum, partes oris, chela, pedes-maxillares pedesque omnino pallide flava, sat longe et tenuiter parce nigro-pilosa. Plaga vulvæ fusco-rufula, postice recte truncata et marginata, fovea media parva rotunda vel ovata impressa. — Yokohama.

Nous ajoutons la description d'une espèce du même genre que nous avons reçue de Pondichéry :

EURYOPIS NUBILA, sp. nov., ♀. — Long. $\frac{1}{4}$ mill. — *E. acuminata* valde affinis. Cephalothorax similis, fusco-nigricans. Oculi postici majores, spatiiis diametro oculi haud vel vix latioribus inter se sejuncti. Area oculorum mediorum multo latior quam longior et antice quam postice latior (in *E. acuminata* parallela). Abdomen magnum, valde convexum, antice rotundum, postice valde declive et acuminatum, nigro-nitidum, setis longis, validis, nigris flavisque conspersum. Chelæ, sternum, partes oris, pedesque nigricantia sat longe pilosa, patellis leviter dilutioribus et rufescenti-tinctis, trochanteribus posticis obscure testaceis. Vulvæ fovea parum profunda, subrotunda (in *E. acuminata*, obtuse triquetra), margine antico leviter elevato cincta. — Pondichéry (Maindron).

